



Blauwmaanzaad

De teelt van blauwmaanzaad vraagt om goede gronden met een goede structuur. Percelen met tamelijk weinig onkruid zoals Melganzevoet, Witteganzevoet en Zwarte nachtschade hebben de voorkeur.

Zaaiadvies

Zo vroeg mogelijk zaaien geeft de hoogste opbrengst en dit kan vanaf maart. Het zaai-bed moet niet te diep worden losgemaakt en het zaad dient op een diepte van 0,5 tot 1,0 cm gezaaid te worden. Om 80 tot 100 planten/m² te verkrijgen zal circa 1 tot 1,5 kg zaaizaad per ha moeten worden gebruikt. De rijafstand varieert van 30 tot 40 cm.

Bemesting

Als stikstofbemesting wordt 90 tot 120 kg zuivere N aanbevolen. Te geven in twee delen van 65% vroeg en 35% vlak voor het begin van de bloei. Blauwmaanzaad verlangt een ruime fosfaat- en kalivoorziening. Overleg met uw adviseur voor het juiste bemestingsregime.

Inzaai ondervrucht

Inzaai van de ondervruchten karwij en/of roodzwenkgras (gewoon en uitlopers vormend) is mogelijk.

Onkruidbestrijding

Raadpleeg uw adviseur omtrent de onkruidbestrijding.

Tripsaantasting

Bij droog en schraal weer enige weken na opkomst loopt het jonge gewas gevaar door trips te worden aangetast. De blaadjes zijn verdikt en krullen naar beneden. Het gewas moet in deze periode regelmatig gecontroleerd worden. Voor een eventuele bespuiting kunt u het beste uw adviseur raadplegen.

Oogsten

Het zaad in de bollen moet voldoende blauw gekleurd zijn, voor het maaidorsen kan beginnen. Men moet oppassen voor dorsbeschadiging omdat dit leidt tot kleurbederf (en eventueel olie-verlies). Na het dorsen dient het product zo snel mogelijk gedroogd te worden om de goede kwaliteit te behouden.

Deze teeltbeschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.